Математическое моделирование терапии ВИЧ-инфекции на основе блокады PD-L1

Желткова В.В., Meyerhans А., Бочаров Г.А.

X конференция по математическим моделям и численным методам в биологии и медицине

Москва, 2018

Общие данные о ВИЧ-инфекции

Стадии развития заболевания

Варианты развития ВИЧ-инфекции

Omari M. Oscillations in a Model for HIV Infection with Three Intracellular Delays and RTI: Delays Can Induce Viral Blips. – 2010.

Антиретровирусная терапия ВИЧ-инфекции

- АРТ позволяет снизить вирусную нагрузку до менее 20—50 копий/мл, восстановить численность CD4 Т-лимфоцитов, значительно увеличить продолжительность жизни.
- Как правило, применяются комбинации из трех-четырех препаратов, воздействующих на разные мишени (ингибиторы протеазы, ингибиторы обратной транскриптазы, ингибиторы рецепторов, ингибиторы слияния)
- Недостатки АРТ: высокая стоимость курса, побочные эффекты, строгий режим приема.

Иммунотерапия ВИЧ-инфекции

Блокада рецептора PD-L1 (*)

APC, antigen presenting cell.
Adapted from Freeman G, et al. J Exp Med 2006
Trautmann L, et al Nat. Med. 2006; Day CL, et al. Nature. 2006;
Petrovas C, et al., JEM 2006; Velu V, et al. Nature. 2009;
Palmer B et al. J Immunol 2013

* Stephen W. Masonb, Srisowmya Sanisettya et. al, Viral Suppression Induced by Anti-PD-L1 Following ARV-Interruption in SIV-Infected Monkeys, 21st Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections

- При хронических инфекциях нарушаются функции CD8 Т-лимфоцитов за счет повышения экспрессии рецептора программируемой клеточной гибели;
- Ранее было показано, что применение блокады PD-L1 может восстановить функции CD8+ Т-лимфоцитов а также снизить вирусную нагрузку при хронических инфекционных заболеваниях;
- Интерес представляет влияние применения блокады PD-L1 на течение ВИЧ-инфекции в хронической фазе на общую динамику заболевания;

Цель и задачи работы

Цель работы: разработка и идентификация математических моделей динамики ВИЧ инфекции для численного моделирования блокады рецептора PD-L1 при различных вариантах течения заболевания.

Задачи:

- Идентификация параметров пролиферативной активности CD8 Т-лимфоцитов по данным проточной цитофлуориметрии при специфической стимуляции клеток;
- Разработка математической модели ВИЧ-инфекции, позволяющей напрямую использовать параметры, полученные при анализе данных проточной цитофлуориметрии;
- Численное моделирование эффекта применения блокады рецептора PD-L1 на основе построенной модели.

Гистограммы проточной цитофлуориметрии

Dustin Frederick Kapraun, Cell Proliferation Models, CFSE-Based Flow Cytometry Data and Quantification of Uncertainty (dissertation)

- Гистограммы CFSE для каждого дня: по оси X – логарифм интенсивности флуоресценции, по Y – соответствующие количества клеток
- Интерпретация данных: каждый пик – поколение клеток, в поколении дочерних клеток интенсивность флуоресценции снижается в 2 раза.
- Систематический сдвиг гистограмм влево (деградация метки)

Математические модели для оценки пролиферативной активности клеток по данным проточной цитофлуориметрии

Анализ гистограмм проточной цитофлуориметрии

Приближение интервалов

- Ось X делится на интервалы, каждый из которых содержит пик, соответствующий определенному поколению;
- Площадь гистограммы под кривой на соответствующем интервале принимается за численность поколения;
- Сложности при наложении пиков

Аппроксимация кривой

- Гистограмма приближается суммой гауссиан;
- Используются методы наименьших квадратов;

Алгоритм декомпозиции гистограмм

Предполагаем, что гистограмма представляет собой сумму гауссиан:

$$H(x) \approx \sum_{i=1}^K w_i G_i(x), \text{ where } G_i(x) = \frac{1}{\sigma_i \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu_i)^2}{2\sigma_i^2}}$$

Численность клеток в i -м поколении

$$N_i = \int_{x_{\min}}^{x_{\max}} w_i G_i(x) dx$$

$$\min_{\{\mu_i, \sigma_i, w_i\}} \int_{x_{\min}}^{x_{\max}} \left| H(x) - \sum_{i=1}^K w_i G_i(x) \right| dx$$

- Шаг 1. Приближение первой гистограммы. Используется предположение, что она содержит данные только для первого поколения. Таким образом, находим $\mu_1^1, \sigma_1^1, w_1^1$.
- Шаг k . Приближение k -й гистограммы с использованием начального приближения
- $\hat{\mu}_1^k = \mu_1^{k-1}$,
- $\hat{\mu}_i^k = \hat{\mu}_1^k - (\log_{10} 2) * (i - 1)$,
- $\hat{\sigma}_i^k = \sigma_1^k, \hat{w}_i^k = w_1^{k-1}$.

Пример декомпозиции гистограмм

Базовая версия модели: Т. Luzyanina et al., 2013 α_i - скорость деления i -го поколения клеток, β_i - скорость гибели i -го поколения клеток, τ_i - задержка деления i -го поколения клеток

$$E_i(t) = E_i^r(t) + E_i^c(t), i = 0, \dots, i_r - 1;$$

$$\frac{dE_0^r(t)}{dt} = -(\alpha_0 + \beta_0)E_0^r(t);$$

$$\frac{dE_i^r(t)}{dt} = -(\alpha_i + \beta_i)E_i^r(t) + 2\alpha_{i-1}E_{i-1}^r(t - \tau_{i-1}), i = 1, \dots, i_r;$$

$$\frac{dE_i^c(t)}{dt} = \alpha_i(E_i^r(t) - E_i^r(t - \tau_i)), i = 1, \dots, i_r;$$

$$E_0^r(\xi) = 0, \xi \in [-\tau_0, 0),$$

$$E_0^r(0) = E_0, E_i^r(\xi) = 0, \xi \in [-\tau_0, 0], i = 1, \dots, i_r,$$

$$E_i^c(\xi) = 0, \xi \in [-\tau_0, 0], i = 1, \dots, i_r,$$

Для описания данных специфической стимуляции нами была предложена адаптация данной модели:

$$\frac{dE_0^r(t)}{dt} = -(\alpha_0 + \beta_0)E_0^r(t),$$

$$\frac{dE_i^r(t)}{dt} = -(\alpha_i + \beta_i)E_i^r(t) + 2\alpha_{i-1}E_{i-1}^r(t - \tau_{i-1}), \quad i = 1, \dots, i_r,$$

$$\frac{dE_i^c(t)}{dt} = \alpha_i(E_i^r(t) - E_i^r(t - \tau_i))$$

$$\frac{dE_{0nonspecific}}{dt} = -(\beta_{0nonspecific})E_{0nonspecific},$$

Начальные условия:

$$E_0^r(\xi) = 0 \quad \xi \in [-\tau_0, 0), \quad E_0^r(0) = \theta E_0,$$

$$E_i^r(0) = 0 \quad \xi \in [-\tau_0, 0], \quad i = 1, \dots, i_r.$$

Идентификация параметров модели

Для тестирования различных постановок задач параметры модели были разбиты на подмножества, для каждого из которых использовались предположения:

- Скорости деления клеток α_i :
 - Все скорости деления равны;
 - Скорость деления первого поколения отличается, остальные равные;
 - Скорости деления всех поколений индивидуальны;
- Скорости гибели клеток β_i :
 - Все скорости гибели равны нулю;
 - Скорость гибели первого поколения ненулевая, остальные равны нулю;
 - Все скорости гибели одинаковы;
 - Скорость гибели первого отличается, остальные одинаковы;
 - Все скорости гибели различаются;
- Задержки деления τ_i :
 - Все задержки одинаковы, кроме первой;
 - Все задержки одинаковы, кроме первой и второй;
 - Все задержки индивидуальны;
- Процент специфических клеток θ :

- Для объяснения эффекта блокады рецептора PD-L1 использовались различные комбинации о сохранении или изменении после применения блокады подмножеств из $[\alpha_i, \beta_i], \tau_i, \theta$. Таким образом, может быть сформулировано $((3 * 5) * 3 * 1) * 2^3 = 360$ постановок обратных задач.
- Наименьшее значение критерия Акаике получается при использовании предположений об индивидуальных скоростях деления, нулевых скоростях гибели и предположении об индивидуальной задержке только для первого или для первого и второго поколений.
- Эффект применения блокады лучше всего может быть объяснён изменением скоростей деления и гибели или процента специфических клеток, но не задержек делений.

Найденные значения параметров пролиферативной активности CD8 Т-лимфоцитов до и после применения блокады

Схема модели динамики ВИЧ-инфекции с блоком, описывающим каскадное деление CD8 Т-лимфоцитов

Уравнения модели динамики ВИЧ-инфекции

$$\frac{dT(t)}{dt} = s + pT(t) - d_T T(t) - kV(t)T(t),$$

$$\frac{dI(t)}{dt} = kV(t)T(t) - \delta I(t) - mE(t)I(t),$$

$$\frac{dV(t)}{dt} = \delta I(t)N - cV(t) - \rho kV(t)T(t),$$

$$\begin{aligned} \frac{dE_0^r(t)}{dt} &= \lambda_E + \{f_{div}(V, I, T, p_{div}) - f_{imp}(V, I, T, p_{imp})E(t)\} \\ &\quad - (\alpha_0 + \beta_0)E_0^r(t) \end{aligned}$$

$$f_{div}(V, I, T, p_{div}) = \frac{b_E I(t)}{I(t) + K_b}, \quad f_{imp}(V, I, T, p_{imp}) = \frac{d_E I(t)}{I(t) + K_d},$$

$$\frac{dE_i^r(t)}{dt} = -(\alpha_i + \beta_i)E_i^r(t) + 2\alpha_{i-1}E_{i-1}^r(t - \tau_{i-1}), \quad i = 1, \dots, i_r,$$

$$\frac{dE_i^c(t)}{dt} = \alpha_i(E_i^r(t) - E_i^r(t - \tau_i)),$$

$$E(t) = \sum_{i=0}^5 (E_i^r(t) + E_i^c(t))$$

Таблица: Переменные модели

Обозн.	Биологический смысл
$T(t)$	К-во здоровых клеток-мишеней, 1/мл
$I(t)$	К-во инфицированных клеток-мишеней, 1/мл
$V_I(t)$	К-во инфекционных вирусных частиц, 1/мл
$V_{NI}(t)$	К-во неинфекционных вирусных частиц, 1/мл
$E_i^c(t)$	К-во специфич. CD8 Т-лимфоцитов, не приступивших к делению, 1/мл
$E_i^c(t)$	К-во специфич. CD8 Т-лимфоцитов, приступивших к делению, 1/мл

Таблица: Параметры модели

Обозн.	Биол. смысл
s	Скорость производства клеток-мишеней, 1/мл*час
p	Скорость гомеостатической пролиферации клеток-мишеней, 1/мл*час
d_T	Скорость гибели клеток-мишеней, 1/мл*час
k	Скорость заражения клеток-мишеней, 1/мл*час*част
δ	Скорость гибели инфицированных клеток-мишеней, 1/мл*час
N	Количество вирусных частиц, производимых инфицированными клетками, част.
c	Скорость выведения вирусных частиц, 1/мл*час
λ_E	Скорость производства CD8 Т-лимфоцитов, 1/мл*час
b_E	Максимальная скорость производства CD8 Т-лимфоцитов, 1/мл*час
K_b	Константа сатурации для деления CD8 Т-лимфоцитов
d_E	Максимальная скорость гибели CD8 Т-лимфоцитов 1/мл*час
K_d	Константа сатурации для гибели CD8 Т-лимфоцитов
α_i	Скорость активации CD8 Т-лимфоцитов i-го поколения, 1/мл*час
β_i	Скорость гибели CD8 Т-лимфоцитов i-го поколения, 1/мл*час
m	Скорость уничтожения инфицированных клеток CD8 Т-лимфоцитами, 1/мл*час*кл
ϵ_{PI}	Эффективность ингибиторов протеазы
ϵ_{RT}	Эффективность ингибиторов обратной транскрипции

Исследование модели

- Было проведено исследование глобальной чувствительности вирусной нагрузки и численности CD4 Т-лимфоцитов в хронической фазе к изменению параметров модели;
- Были выявлены параметры, изменение которых вносит наибольший вклад в изменение вирусной нагрузки и численности CD4 Т-лимфоцитов (s, N, k, c)
- Были сформулированы и решены задачи оценивания параметров модели для различных вариантов развития инфекции:
 - H1: зафиксированы все параметры, кроме s
 - H2: зафиксированы все параметры, кроме N
 - H3: зафиксированы все параметры, кроме k
 - H4: зафиксированы все параметры, кроме c
 - H5: зафиксированы все параметры, кроме s, c

Решение модели и экспериментальные данные для различных вариантов развития инфекции

long term nonprogressors, HIV controllers

slow progressors, HIV controllers

slow progressors, viral controllers

progressors, viral controllers

progressors, medium viral load

progressors, high viral load

Влияние применения блокады рецептора PD-L1 на ключевые показатели ВИЧ-инфекции в хронической фазе при различных вариантах заболевания

Зависимость предсказанного результата блокады рецептора PD-L1 от предположения о том, какие именно параметры пролиферативной активности изменяются в результате воздействия.

Модель комбинированной терапии (АРТ + блокада рецептора PD-L1)

$$\frac{dT(t)}{dt} = s + pT(t) - d_T T(t) - kV(t)T(t),$$

$$\frac{dI(t)}{dt} = (1 - \epsilon_{RT})kV_I(t)T(t) - \delta I(t) - mE(t)I(t),$$

$$\frac{dV_I}{dt} = (1 - \epsilon_{PI})\delta NI - cV_I - \rho kV(t)T(t),$$

$$\frac{dV_{NI}}{dt} = \epsilon_{PI}\delta NI - cV_{NI}$$

$$\begin{aligned} \frac{dE_0^f(t)}{dt} &= \lambda_E + \{f_{div}(V, I, T, p_{div}) - f_{imp}(V, I, T, p_{imp})E(t)\} \\ &\quad - (\alpha_0 + \beta_0)E_0^f(t) \end{aligned}$$

$$f_{div}(V, I, T, p_{div}) = \frac{b_E I(t)}{I(t) + K_b}, \quad f_{imp}(V, I, T, p_{imp}) = \frac{d_E I(t)}{I(t) + K_d},$$

$$\frac{dE_i^f(t)}{dt} = -(\alpha_i + \beta_i)E_i^f(t) + 2\alpha_{i-1}E_{i-1}^f(t - \tau_{i-1}), \quad i = 1, \dots, i_r,$$

$$\frac{dE_i^c(t)}{dt} = \alpha_i(E_i^f(t) - E_i^c(t - \tau_i)),$$

$$E(t) = \sum_{i=0}^5 (E_i^f(t) + E_i^c(t))$$

- В рамках рассматриваемой модели начиная с некоторого порога эффективности комбинированной терапии $f(\epsilon_{PI}, \epsilon_{RT})$, вирусная нагрузка снижается до нулевого уровня и количество клеток-мишеней нормализуется, и это значение ниже для более благоприятных вариантов развития заболевания.
- Эффективность ингибиторов обратной транскрипции сильнее влияет на итоговую вирусную нагрузку;
- Эффект применения блокады рецептора PD-L1 повышается при более высокой эффективности комбинированной терапии;

Полученные результаты

- Оценены параметры пролиферативной активности CD8 Т-лимфоцитов для специфической стимуляции
- Изучены различные предположения, объясняющие повышение пролиферативной активности клеток в результате применения блокады PD-L1
- Построена математическая модель динамики ВИЧ-инфекции, позволяющая напрямую использовать данные, полученные при анализе гистограмм CFSE
- С помощью построенной модели были проведено численное моделирование применения блокады рецептора PD-L1 для различных вариантов течения заболевания
- Построенная модель была расширена для численного моделирования комбинированной терапии (АРТ + блокада рецептора PD-L1)

Далее планируется расширить модель, добавив в неё описание динамики регуляторных Т-лимфоцитов.

Спасибо за внимание!

Работа выполнена при поддержке грантов РФФ 15-11-00029 и 18-11-00171.